



[www.ausl2.umbria.it](http://www.ausl2.umbria.it)



Disinfestazione  
Derattizzazione  
Disinfezione  
tel. 075 5412446/2436;  
fax 075 5412460  
[zanzara@ausl2.umbria.it](mailto:zanzara@ausl2.umbria.it)

Le attività di prevenzione contro la presenza della **Zanzara Tigre** sono oggi ancora più importanti, in quanto sono stati rilevati i primi casi in Italia della malattia di **Chikungunya** trasmessa all'uomo attraverso la puntura di queste zanzare. La malattia, che significa "camminare piegato in avanti", termine che rispecchia la sintomatologia caratterizzata da dolori articolari intensi e diffusi, si manifesta dopo 4-7 giorni dalla puntura di una zanzara con febbre, mal di testa ed appunto forti dolori osteo-articolari. Il decorso è generalmente benigno, ma la sintomatologia può persistere per alcune settimane.

La **zanzara tigre** è facilmente distinguibile dalla zanzara nostrana perché è **nera** e non marrone, per la minore grandezza e perché punge di giorno ed è più aggressiva.




Le **uova** vengono deposte in **piccoli contenitori** di acqua scoperti e le larve si schiudono in pochi giorni durante l'estate. D'inverno le uova rimangono in stasi per aprirsi in primavera.



Quest'anno facciamo **prevenzione** per evitare di vederci ridurre le gambe in questo modo e per prevenire il **Virus della Chikungunya**



**Togliamo i sottovasi** dalle piante, o mettiamo della **sabbia** per lettiere per gatti nel sottovaso...assorbe l'acqua e le piante stanno meglio



**Mettiamo** nelle **caditoie** dei tombini presenti nei piazzali privati da aprile a ottobre una compressa al mese di **larvicida**, si acquista in farmacia o nei negozi agricoli



**Eliminiamo** tutti i **bidoni ed i secchi** che non sono chiudibili con coperchi a vite dagli orti e dai giardini.



Mettiamo **pesci rossi** nelle vasche **ornamentali**. Le larve di zanzara sono un buon cibo per loro!

**zanzare tigre... lasciamola senza acqua**